

<関節リウマチ>

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
エンド キサンパ [®] ルス	シクロホスファミド [®]	CPA	1000mg/m ²	div	d1	28日
	メスナ	Mesna	400mg(3回/日)			
エンド キサンパ [®] ルス(低用量)	シクロホスファミド [®]	CPA	15mg/kg	div	d1	14日
アクテムラ	トシリズ [®] マブ [®]	TCZ	8mg/kg	div	d1	28日
オレンシア(BW60kg未満)	アバ [®] タセブ [®] ト	Abatacept	500mg/body	div	初回投与後、2週、4週、以降4週毎	-
オレンシア(BW60kg～100kg)	アバ [®] タセブ [®] ト	Abatacept	750mg/body	div	初回投与後、2週、4週、以降4週毎	-
オレンシア(BW100kgを超える)	アバ [®] タセブ [®] ト	Abatacept	1000mg/body	div	初回投与後、2週、4週、以降4週毎	-
New レミケード [®]	インフリキシマブ [®]	IFX	3mg/kg	div	初回投与後、2週、6週、以降8週毎	-
New レミケード [®] (10mg/kg)	インフリキシマブ [®]	IFX	10mg/kg	div	6週投与後、8週毎	-

※患者の状態に合わせて、投与量やスケジュールを変更することがあります。