

<ホジキンリンパ腫>

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
ABVD	ド キソルビ シン	ADR	25mg/m ²	div	d1.15	28日
	ブ レオマイシン	BLM	10mg/m ²	div	d1.15	
	ビ ンブ ラスチン	VBL	6mg/m ²	div	d1.15	
	ダ カルバ ジン	DTIC	375mg/m ²	div	d1.15	
ABVd	ド キソルビ シン	ADR	25mg/m ²	div	d1.15	21日
	ブ レオマイシン	BLM	9mg/m ²	div	d1.15	
	ビ ンブ ラスチン	VBL	6mg/m ²	div	d1.15	
	ダ カルバ ジン	DTIC	250mg/m ²	div	d1.15	
ABVd(単独)	ド キソルビ シン	ADR	25mg/m ²	div	d1	14日
	ブ レオマイシン	BLM	9mg/m ²	div	d1	
	ビ ンブ ラスチン	VBL	6mg/m ²	div	d1	
	ダ カルバ ジン	DTIC	250mg/m ²	div	d1	
BEACOPP	ド キソルビ シン	ADR	25mg/m ²	div	d1	21日
	シクロホスファミド	CPA	650mg/m ²	div	d1	
	エトポ シド	ETP	100mg/m ²	div	d1-3	
	ビ ンクリスチン	VCR	1.4mg/m ²	div	d8	
	ブ レオマイシン	BLM	10mg/m ²	div	d8	
BEACOPP(高用量)	ド キソルビ シン	ADR	35mg/m ²	div	d1	21日
	シクロホスファミド	CPA	1250mg/m ²	div	d1	
	エトポ シド	ETP	200mg/m ²	div	d1-3	
	ビ ンクリスチン	VCR	1.4mg/m ²	div	d8	
	ブ レオマイシン	BLM	10mg/m ²	div	d8	
アド セトリス	ブ レンツキシマブ ヘ ド チン	BV	1.8mg/kg	div	d1	14-21日
キイトルーダ ホジ キンリンパ 腫(3週間毎)	ペ ンブ ロリス マブ	Pembro	200mg	div	d1	21日
キイトルーダ ホジ キンリンパ 腫(6週間毎)	ペ ンブ ロリス マブ	Pembro	400mg	div	d1	42日

※患者の状態に合わせて、投与量やスケジュールを変更することがあります。