

<急性骨髄性白血病>

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
A-triple-V 寛解導入	エトポシド	ETP	100mg/㎡	div	d1-5	-
	シタラビン	AraC	100mg/㎡	div	d1-7	
	ビンクリスチン	VCR	0.8mg/㎡	div	d10	
	ビンブラスチン	VBL	6mg/㎡	div	d12	
ACR+ETP	エトポシド	ETP	100mg/㎡	div	d1-5	-
	アクリルビン	ACR	60mg/㎡	div	d1-5	
AraC+ACR少量	シタラビン	AraC	20mg/㎡	div	d1-5	-
	アクリルビン	ACR	10mg/㎡	div	d1-5	
AraC中等IDA併用	イダルビン	IDR	8mg/㎡	div	d1-5	-
	シタラビン	AraC	1000mg/㎡	div	d1-3	
AraC大量MIT併用	シタラビン	AraC	3000mg/㎡	div	d1-4	-
	ミトキサントロン	MIT	12mg/㎡	div	d3-5	
	シタラビン	AraC	3000mg/㎡	div	d1.2.8.9	
AraC大量MIT併用(sequential)	ミトキサントロン	MIT	10mg/㎡	div	d3.4.10.11	-
	アクリルビン	ACR	14mg/㎡	div	d1-3	
			14mg/㎡	div	d1	
CAG併用	シタラビン	AraC	10mg/㎡	div	d1-13	-
	ダウナルビン	DNR	70mg/㎡	div	d1-5	
FLAG-IDA	フルダラビン	FLU	30mg/㎡	div	d1-5	21日
	イダルビン	IDR	10mg/㎡	div	d1-3	
	シタラビン	AraC	2000mg/㎡	div	d1-5	
Low dose AraC	シタラビン	AraC	10mg/㎡	div	d1-5	-
Low dose AraC 持続	シタラビン	AraC	20mg/㎡	div	d1-5	-
MEC	ミトキサントロン	MIT	8mg/㎡	div	d1-3	-
	エトポシド	ETP	100mg/㎡	div	d1-5	
	シタラビン	AraC	100mg/㎡	div	d1-7	
MEC(原著)	エトポシド	ETP	80mg/㎡	div	d1-6	-
	シタラビン	AraC	1000mg/㎡	div	d1-6	
	ミトキサントロン	MIT	6mg/㎡	div	d1-6	
MEC(高用量)	シタラビン	AraC	1000mg/㎡	div	d1-4	-
	ミトキサントロン	MIT	8mg/㎡	div	d1-5	
	エトポシド	ETP	100mg/㎡	div	d1-5	
低用量AraC【皮下注】(ヘパタキス併用)	シタラビン	AraC	20mg/㎡	sc	d1-10	28日
低用量AraC	シタラビン	AraC	30mg/㎡	div	d1-21	-
大量AraC(サグレルゲン併用)	シタラビン	AraC	3000mg/㎡	div	d1.3.5	28日
サグレルゲン少量持続	アクリルビン	ACR	14mg/㎡	div	d1-4	-
	シタラビン	AraC	20mg/㎡	div	d1-14	
トリセノックス(APL用)	三酸化二ヒ素	ATO	0.15mg/kg	div	d1-5	-
マイロターゲ	ゲムズマブ オゾガマイシン	GO	9mg/㎡	div	d1	14日
AML201 地固めC群 AraC大量(60歳以上)	シタラビン	AraC	1500mg/㎡	div	d1-5	-
AML201 地固めC群 AraC大量	シタラビン	AraC	2000mg/㎡	div	d1-5	-
AML201 地固め 第1コース	ミトキサントロン	MIT	7mg/㎡	div	d1-3	-
	シタラビン	AraC	200mg/㎡	div	d1-5	
AML201 地固め 第2コース	ダウナルビン	DNR	50mg/㎡	div	d1-3	-
	シタラビン	AraC	200mg/㎡	div	d1-5	
AML201 地固め 第3コース	アクリルビン	ACR	20mg/㎡	div	d1-5	-
	シタラビン	AraC	200mg/㎡	div	d1-5	
AML201 地固め 第4コース	エトポシド	ETP	100mg/㎡	div	d1-5	-
	シタラビン	AraC	200mg/㎡	div	d1-5	
	ビンクリスチン	VCR	0.8mg/㎡	div	d8	
	ビンデシシン	VDS	2mg/㎡	div	d10	
AML201 寛解導入 A群	イダルビン	IDR	12mg/㎡	div	d1-3	-
	シタラビン	AraC	100mg/㎡	div	d1-7	
	ダウナルビン	DNR	50mg/㎡	div	d1-5	
AML201 寛解導入 B群	シタラビン	AraC	100mg/㎡	div	d1-7	-
	シタラビン	AraC	2000mg/㎡	div	d1-5	
AML201 寛解導入 C群	ミトキサントロン	MIT	7mg/㎡	div	d1-3	-
	シタラビン	AraC	200mg/㎡	div	d1-5	
AML97 地固め A群 第1コース	ダウナルビン	DNR	30mg/㎡	div	d1-3	-
	シタラビン	AraC	200mg/㎡	div	d1-5	
AML97 地固め A群 第2コース	アクリルビン	ACR	20mg/㎡	div	d1-3	-
	シタラビン	AraC	200mg/㎡	div	d1-5	
AML97 地固め A群 第3コース	エトポシド	ETP	100mg/㎡	div	d1-5	-
	シタラビン	AraC	200mg/㎡	div	d1-5	
AML97 地固め 第4コース	ビンクリスチン	VCR	0.8mg/㎡	div	d8	-
	ビンデシシン	VDS	2mg/㎡	div	d10	
	シタラビン	AraC	200mg/㎡	div	d1-5	
	ミトキサントロン	MIT	7mg/㎡	div	d1-3	
AML97 地固め B群 第1コース	シタラビン	AraC	200mg/㎡	div	d1-5	-
	シタラビン	AraC	200mg/㎡	div	d1-5	
AML97 地固め B群 第2コース	エトポシド	ETP	100mg/㎡	div	d1-5	-
	エシタラビン	BH-AC	200mg/㎡	div	d1-7	
	アクリルビン	ACR	20mg/㎡	div	d1-7	
AML97 地固め B群 第3コース	シタラビン	AraC	200mg/㎡	div	d1-7	-
	イダルビン	IDR	12mg/㎡	div	d1-3	
AML97 寛解導入 第1コース	シタラビン	AraC	100mg/㎡	div	d1-7	-
	シタラビン	AraC	100mg/㎡	div	d1-7	

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
AML97 維持・強化 第1コース	ダウルビシ	DNR	50mg/㎡	div	d1.4	-
	エシタビシ	BH-AC	170mg/㎡	div	d1-5	
AML97 維持・強化 第2コース	ミキサントロン	MIT	5mg/㎡	div	d1.2	-
	エシタビシ	BH-AC	170mg/㎡	div	d1-5	
AML97 維持・強化 第3コース	ビンデシ	VDS	2mg/㎡	div	d1.8	-
	エトポシド	ETP	80mg/㎡	div	d1.3.5	
	エシタビシ	BH-AC	170mg/㎡	div	d1-5	
AML97 維持・強化 第4コース	アクトラルビシ	ACR	14mg/㎡	div	d1-4	-
	エシタビシ	BH-AC	170mg/㎡	div	d1-5	
AML97 維持・強化 第5コース	ダウルビシ	DNR	50mg/㎡	div	d1.4	-
	エシタビシ	BH-AC	170mg/㎡	div	d1-5	
AML97 維持・強化 第6コース	ビンデシ	VDS	2mg/㎡	div	d1.8	-
	エトポシド	ETP	80mg/㎡	div	d1.3.5	
	エシタビシ	BH-AC	170mg/㎡	div	d1-5	
APL97 地固め 第1コース	ミキサントロン	MIT	7mg/㎡	div	d1-3	-
	シタラビシ	AraC	200mg/㎡	div	d1-5	
APL97 地固め 第2コース	ダウルビシ	DNR	50mg/㎡	div	d1-3	-
	シタラビシ	AraC	140mg/㎡	div	d1-5	
	エトポシド	ETP	100mg/㎡	div	d1-5	
APL97 地固め 第3コース	イダルビシ	IDR	12mg/㎡	div	d1-3	-
	シタラビシ	AraC	140mg/㎡	div	d1-5	
APL97 寛解導入 B群	イダルビシ	IDR	12mg/㎡	div	d1.2	-
	シタラビシ	AraC	80mg/㎡	div	d1-5	
APL97 寛解導入 C群	イダルビシ	IDR	12mg/㎡	div	d1-3	-
	シタラビシ	AraC	100mg/㎡	div	d1-5	
APL97 維持強化 第1コース	ダウルビシ	DNR	30mg/㎡	div	d1.4	-
	エシタビシ	BH-AC	170mg/㎡	div	d1-5	
APL97 維持強化 第2コース	ミキサントロン	MIT	5mg/㎡	div	d1.2	-
	エシタビシ	BH-AC	170mg/㎡	div	d1-5	
APL97 維持強化 第3コース	ビンデシ	VDS	2mg/㎡	div	d1.8	-
	エトポシド	ETP	80mg/㎡	div	d1.3.5	
	エシタビシ	BH-AC	170mg/㎡	div	d1-5	
APL97 維持強化 第4コース	アクトラルビシ	ACR	14mg/㎡	div	d1-4	-
	エシタビシ	BH-AC	170mg/㎡	div	d1-5	
APL97 維持強化 第5コース	ダウルビシ	DNR	30mg/㎡	div	d1.4	-
	エシタビシ	BH-AC	170mg/㎡	div	d1-5	
APL97 維持強化 第6コース	ビンデシ	VDS	2mg/㎡	div	d1.8	-
	エトポシド	ETP	80mg/㎡	div	d1.3.5	
	エシタビシ	BH-AC	170mg/㎡	div	d1-5	
【寛解導入:第1サイクル】ビキセス	ダウルビシ+シタラビシ	CPX-351	100単位/㎡	div	d1.3.5	14日
【寛解導入:第2サイクル】ビキセス	ダウルビシ+シタラビシ	CPX-351	100単位/㎡	div	d1.3	35日
【地固め】ビキセス	ダウルビシ+シタラビシ	CPX-351	65単位/㎡	div	d1.3	35日

※患者の状態に合わせて、投与量やスケジュールを変更することがあります。