

<骨髄異形成症候群>

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
AraC + ACR少量	シタラビ [®] ン	AraC	20mg/m ²	div	d1-5	-
	アクリルビ [®] ン	ACR	10mg/m ²	div	d1-5	
AraC + MIT 地固め1	ミトキサントロン	MIT	7mg/m ²	div	d1-3	-
	シタラビ [®] ン	AraC	200mg/m ²	div	d1-5	
Low dose AraC	シタラビ [®] ン	AraC	10mg/m ²	div	d1-5	-
Low dose AraC 持続	シタラビ [®] ン	AraC	20mg/m ²	div	d1-5	-
MDS200-A 寛解導入	イダルビ [®] ン	IDR	12mg/m ²	div	d1-4	-
	シタラビ [®] ン	AraC	100mg/m ²	div	d1-7	
MDS200-B 寛解導入	アクリルビ [®] ン	ACR	14mg/m ²	div	d1-4	-
	シタラビ [®] ン	AraC	30mg/m ²	div	d1-14	
アザ [®] シチジン点滴静注	アザ [®] シチジン	AZA	75mg/m ²	div	d1-7	28日
アザ [®] シチジン点滴静注(外来)	アザ [®] シチジン	AZA	75mg/m ²	div	d1-5.8.9	28日
アザ [®] シチジン皮下投与	アザ [®] シチジン	AZA	75mg/m ²	sc	d1-7	28日
アザ [®] シチジン皮下投与(外来)	アザ [®] シチジン	AZA	75mg/m ²	sc	d1-5.8.9	28日

※患者の状態に合わせて、投与量やスケジュールを変更することがあります。