

<子宮頸がん>

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
mTC(3週毎)	パ [®] クリタキセル	PTX	180mg/m ²	div	d1	21日
	カルボ [®] プ [®] ラチン	CBDCA	AUC6	div	d1	
CPT-11 + CDDP	イリノテカン	CPT-11	60mg/m ²	div	d1.8.15	28日
	シスプ [®] ラチン	CDDP	60mg /m ²	div	d1	
CPT-11 + NDP	イリノテカン	CPT-11	60mg/m ²	div	d1.8	28日
	ネダ [®] プ [®] ラチン	NDP	80mg /m ²	div	d1	
ddTC(3週毎)	パ [®] クリタキセル	PTX	80mg/m ²	div	d1.8.15	21日
	カルボ [®] プ [®] ラチン	CBDCA	AUC6	div	d1	
CDDP(放射線治療併用)	シスプ [®] ラチン	CDDP	40mg/m ²	div	d1	7日
キイトルーダ [®] + TC + BEV	キイトルーダ [®]	Pembro	200mg/body	div	d1	21日
	カルボ [®] プ [®] ラチン	CBDCA	AUC5	div	d1	
	パ [®] クリタキセル	PTX	175mg/m ²	div	d1	
	ベ [®] ハ [®] シズ [®] マブ [®]	BEV	15mg /kg	div	d1	

※患者の状態に合わせて、投与量やスケジュールを変更することがあります。