

<子宮体がん>

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
mTC(3週毎)	パクリタキセル	PTX	180mg/m ²	div	d1	21日
	カルボプタチン	CBDCA	AUC6	div	d1	
DC(3週毎)	ドセタキセル	DTX	70mg/m ²	div	d1	21日
	カルボプタチン	CBDCA	AUC6	div	d1	
DP(3週毎)	ドセタキセル	DTX	70mg/m ²	div	d1	21日
	シスプラチン	CDDP	60mg/m ²	div	d1	
AP(3週毎)	トキソリブシン	ADR	60mg/m ²	div	d1	21日
	シスプラチン	CDDP	50mg/m ²	div	d1	
ddTC(3週毎)	パクリタキセル	PTX	80mg/m ²	div	d1,8,15	21日
	カルボプタチン	CBDCA	AUC6	div	d1	
キイトルーダ® + レンビマ®(3週毎)	ペムブロリスマブ®	Pembro	200mg/body	div	d1	21日
	レンバチニブ®	Lenvatinib	20mg/body	div	連日	
キイトルーダ® + レンビマ®(6週毎)	ペムブロリスマブ®	Pembro	400mg/body	div	d1	42日
	レンバチニブ®	Lenvatinib	20mg/body	div	連日	

※患者の状態に合わせて、投与量やスケジュールを変更することがあります。