

<絨毛性疾患>

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
MTX(静注)	メソトレキセート	MTX	20mg/body	div	d1-5	7日
MTX(筋注)	メソトレキセート	MTX	20mg/body	im	d1-5	7日
MA	メソトレキセート	MTX	20mg/body	div	d1-5	14日
	アクチノマイシンD	ACT-D	0.2mg /body	div	d1-5	
MEA	メソトレキセート	MTX	150mg/body	iv	d1	21日
	メソトレキセート	MTX	300mg/body	div	d1	
	エトポシド	ETP	100mg/m ²	div	d1-5	
	アクチノマイシンD	ACT-D	0.5mg /body	div	d1-5	
MTX単回(筋注)	メソトレキセート	MTX	50mg/m ²	im	d1	7日
EMA/CO	アクチノマイシンD	ACT-D	0.5mg/body	div	d1-2	14日
	エトポシド	ETP	100mg/m ²	div	d1-2	
	メソトレキセート	MTX	300mg/m ²	div	d1	
	ビンクリスチン	VCR	1mg/m ²	div	d8	
	シクロホスファミド	CPA	600mg /m ²	div	d8	

※患者の状態に合わせて、投与量やスケジュールを変更することがあります。