

膵癌

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
TS-1/GEM(3週1クール)	テカ [®] フール/キ [®] メラシル/オテラシルカリウム	S-1	60mg/m ²	po	d1-14	21日
	ゲ [®] ムシタビ [®] ン	GEM	1000mg/m ²	div	d8.15	
ジ [®] ェムザ [®] ール(2投1休)	ゲ [®] ムシタビ [®] ン	GEM	1000mg/m ²	div	d1.8	21日
ジ [®] ェムザ [®] ール+アブ [®] ラキサン(4週1クール)	アルブ [®] ミン懸濁型パ [®] クリタキセル	nab-PTX	125mg/m ²	div	d1.8.15	28日
	ゲ [®] ムシタビ [®] ン	GEM	1000mg/m ²			
mFOLFIRINOX	オキサリプ [®] ラチン	L-OHP	85mg/m ²	div	d1	14日
	レボ [®] ホリナート	I-LV	200mg/m ²	div	d1	
	イリノテカン	CPT-11	150mg/m ²	div	d1	
	フルオロウラシル	5-FU	2400mg/m ²	Ci	d1-2	
ジ [®] ェムザ [®] ール+タルセパ [®]	エルロチニブ [®]	Erlotinib	100mg	po	d1-28	28日
	ゲ [®] ムシタビ [®] ン	GEM	1000mg/m ²	div	d1.8.15	
オニバ [®] イド [®] +5FU+LV	ナノリボ [®] ソーム型イリノテカン	nal-IRI	70mg/m ²	div	d1	14日
	レボ [®] ホリナート	I-LV	200mg/m ²	div	d1	
	フルオロウラシル	5-FU	2400mg/m ²	Ci	d1-2	

※患者の状態に合わせて、投与量やスケジュールを変更することがあります。