<尿路上皮がん>

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
PCG	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	PTX	80mg/㎡	div	d 1.8	21日
	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	GEM	1000mg/㎡	div	d 1.8	
	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	CDDP	70mg/㎡	div	d 1	
M-VAC	ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ	MTX	30mg/㎡	div	d 1	21日
	ﾋﾞﾝﾌﾞﾗｽﾁﾝ	VLB	3mg/㎡	div	d 2	
	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	ADR	30mg/㎡	div	d 2	
	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	CDDP	70mg/㎡	div	d 2	
PCG(70)	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	PTX	70mg/㎡	div	d 1	28日
	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	GEM	1000mg/㎡	div	d 1	
	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	CDDP	70mg/㎡	div	d 1	
GC	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	GEM	1000mg/㎡	div	d 1.8.15	28日
	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	CDDP	70mg/㎡	div	d 2	
GEM+CBDCA	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	GEM	1000mg/㎡	div	d 1.8	21日
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC5	div	d 1	
ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ	ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ	Pembro	200mg/body	div	d1	21日
ﾊﾟﾄﾞｾﾌﾞ	ｴﾝﾎﾙﾂﾏﾌﾞﾍﾞﾄﾞﾁﾝ	EV	1.25mg/kg	div	d1.8.15	28日
ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ	ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ	Pembro	400mg/body	div	d1	42日
ﾊﾞﾍﾞﾝﾁｵ	ｱﾍﾞﾙﾏﾌﾞ	AVE	10mg/kg	div	d1	14日
【術後】ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ	ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ	Nivo	480mg/body	div	d1	28日
NAC GC	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	GEM	1000mg/㎡	div	d 1.8	21日
	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	CDDP	70mg/㎡	div	d 2	
dd-M-VAC	ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ	MTX	30mg/㎡	div	d 1	14日
	ﾋﾞﾝﾌﾞﾗｽﾁﾝ	VLB	3mg/㎡	div	d 2	
	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	ADR	30mg/㎡	div	d 2	
	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	CDDP	70mg/㎡	div	d 2	
Pembro+EV	ﾍﾟﾑﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ	Pembro	200mg/body	div	d 1	21日
	ｴﾝﾎﾙﾂﾏﾌﾞﾍﾞﾄﾞﾁﾝ	EV	1.25mg/kg	div	d1.8	
Nivo+GC	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	GEM	1000mg/㎡	div	d 1.8	21日
	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	CDDP	70mg/㎡	div	d 2	
	ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ	Nivo	360mg/body	div	d1	

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
【CDDP不耐】Nivo+GEM+CBDCA	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	GEM	1000mg/㎡	div	d 1.8	21日
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC5	div	d1	
	ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ	Nivo	360mg/body	div	d1	
【Nivo+GC後 維持】ｵﾌﾟｼﾞｰﾎﾞ	ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ	Nivo	480mg/body	div	d1	28日
【NAC】ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ+GC	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	GEM	1000mg/㎡	div	d 1.8	21日
	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	CDDP	70mg/㎡	div	d 2	
	ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ	Durvalumab	1500mg/body	div	d1	
【術後】ｲﾐﾌｨﾝｼﾞ	ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ	Durvalumab	1500mg/body	div	d1	28日
GEM+PTX	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	GEM	1000mg/㎡	div	d 1.8.15	21日
	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	PTX	200mg/㎡	div	d 1	

※患者の状態に合わせて、投与量やスケジュールを変更することがあります。