<関節リウマチ>

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
ｴﾝﾄﾞｷｻﾝﾊﾟﾙｽ	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	1000mg/㎡	div	d1	28日
	ﾒｽﾅ	Mesna	400mg(3回/日)			
ｴﾝﾄﾞｷｻﾝﾊﾟﾙｽ(低用量)	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	15mg/kg	div	d1	14日
ｱｸﾃﾑﾗ	ﾄｼﾘｽﾞﾏﾌﾞ	TCZ	8mg/kg	div	d1	28日
ｵﾚﾝｼｱ(BW60kg未満)	ｱﾊﾞﾀｾﾌﾟﾄ	Abatacept	500mg/body	div	初回投与後、2週、4週、以降4週毎	-
ｵﾚﾝｼｱ(BW60kg～100kg)	ｱﾊﾞﾀｾﾌﾟﾄ	Abatacept	750mg/body	div	初回投与後、2週、4週、以降4週毎	-
ｵﾚﾝｼｱ(BW100kgを超える)	ｱﾊﾞﾀｾﾌﾟﾄ	Abatacept	1000mg /body	div	初回投与後、2週、4週、以降4週毎	-
New　ﾚﾐｹｰﾄﾞ	ｲﾝﾌﾘｷｼﾏﾌﾞ	IFX	3mg/kg	div	初回投与後、2週、6週、以降8週毎	-
New　ﾚﾐｹｰﾄﾞ(10mg/kg)	ｲﾝﾌﾘｷｼﾏﾌﾞ	IFX	10mg/kg	div	6週投与後、8週毎	-

※患者の状態に合わせて、投与量やスケジュールを変更することがあります。