<急性リンパ性白血病>

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
【1ｸｰﾙ目】ｲﾉﾂｽﾞﾏﾌﾞｵｿﾞｶﾞﾏｲｼﾝ	ｲﾉﾂｽﾞﾏﾌﾞｵｿﾞｶﾞﾏｲｼﾝ	inotuzumab ozogamicin	0.8mg/㎡	div	d1	21日
			0.5mg/㎡	div	d8.15	
【体重45kg以上 1ｻｲｸﾙ目】ﾌﾞﾘﾅﾂﾓﾏﾌﾞ（寛解導入）	ﾌﾞﾘﾅﾂﾓﾏﾌﾞ	blinatumomab	9μg	div	d1-7	42日
			28μg	div	d8-28	
【体重45kg以上 2ｻｲｸﾙ以降】ﾌﾞﾘﾅﾂﾓﾏﾌﾞ（地固め・維持）	ﾌﾞﾘﾅﾂﾓﾏﾌﾞ	blinatumomab	28μg	div	d1-28	42-56日
【体重45kg未満 1ｻｲｸﾙ目】ﾌﾞﾘﾅﾂﾓﾏﾌﾞ（寛解導入）	ﾌﾞﾘﾅﾂﾓﾏﾌﾞ	blinatumomab	5μg/㎡	div	d1-7	42日
			15μg/㎡	div	d8-28	
【体重45kg未満 2ｻｲｸﾙ以降】ﾌﾞﾘﾅﾂﾓﾏﾌﾞ（地固め・維持）	ﾌﾞﾘﾅﾂﾓﾏﾌﾞ	blinatumomab	15μg/㎡	div	d1-28	42-56日
【寛解2ｸｰﾙ目以降】ｲﾉﾂｽﾞﾏﾌﾞｵｿﾞｶﾞﾏｲｼﾝ	ｲﾉﾂｽﾞﾏﾌﾞｵｿﾞｶﾞﾏｲｼﾝ	inotuzumab ozogamicin	0.5mg/㎡	div	d1.8.15	28日
【非寛解2ｸｰﾙ目以降】ｲﾉﾂｽﾞﾏﾌﾞｵｿﾞｶﾞﾏｲｼﾝ	ｲﾉﾂｽﾞﾏﾌﾞｵｿﾞｶﾞﾏｲｼﾝ	inotuzumab ozogamicin	0.8mg/㎡	div	d1	28日
			0.5mg/㎡	div	d8.15	
ｸﾛﾌｧﾗﾋﾞﾝ	ｸﾛﾌｧﾗﾋﾞﾝ	clofarabine	30mg/㎡	div	d1-5	-
ﾈﾗﾗﾋﾞﾝ	ﾈﾗﾗﾋﾞﾝ	NEL	1500mg/㎡	div	d1.3.5	21日
ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ	ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ	VCR	1.4mg/㎡	div	d1	-
ALL202-U　第20週～25週(Reconsolidation therapy)	ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ	MTX	150mg/㎡	div	d1.15.29	42日
			15mg	it	d29	
	ｼﾀﾗﾋﾞﾝ	AraC	30mg	it	d29	
	ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ	hydrocortisone	25mg	it	d29	
ALL202-U　第20週～25週(Reconsolidation therapy)	ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ	MTX	15mg	it	d1.8	42日
	ｼﾀﾗﾋﾞﾝ	AraC	30mg	it	d1.8	
	ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ	MTX	150mg/㎡	div	d29	
ALL202-U　第26~29週、46～49週、66～69週、86～89週	ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ	VCR	1.5mg/㎡	div	d1.8.15	28日
	L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾅｰｾﾞ	L-ASP	10000KU/㎡	div	d1.8.15	
	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	600mg/㎡	div	d8	
ALL202-U　第30~35週、40～45週、50～55週、60～65週	ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ	MTX	150mg/㎡	div	d1.15.29	42日
			15mg	it	d29	
	ｼﾀﾗﾋﾞﾝ	AraC	30mg	it	d29	
	ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ	hydrocortisone	25mg	it	d29	
ALL202-U　第36~39週、56～59週、76～79週、96～99週	ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ	VCR	1.5mg/㎡	div	d1.8.15	28日
	L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾅｰｾﾞ	L-ASP	10000KU/㎡	div	d1.8.15	
	ﾋﾞﾗﾙﾋﾞｼﾝ	THP	25mg/㎡	div	d8	

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
ALL202-U　第1~5週（Induction therapy）	ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ	MTX	12mg	it	d1	35日
			15mg	it	d8.11.15.22	
	ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ	VCR	1.5mg/㎡	div	d8.15.22.29	
	ﾋﾞﾗﾙﾋﾞｼﾝ	THP	25mg/㎡	div	d8.9	
	ｼﾀﾗﾋﾞﾝ	AraC	30mg	it	d8.11.15.22	
	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	1200mg/㎡	div	d10	
	ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ	hydrocortisone	25mg	it	d8.11.15.22	
	L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾅｰｾﾞ	L-ASP	6000KU/㎡	div	d15.17.19.21.23.25.27.29	
	ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ	PSL	60mg/㎡	div	d1-7	
	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ	DEX	13.2mg	div	d8-14	
ALL202-U　第6~9週（Consolidation therapy）	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	750mg/㎡	div	d1.8	28日
	ﾋﾞﾗﾙﾋﾞｼﾝ	THP	25mg/㎡	div	d1.2	
	ｼﾀﾗﾋﾞﾝ	AraC	75mg/㎡	div	d1-6.8-13	
	ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ	MTX	15mg	it	d1.8	
	ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ	hydrocortisone	25mg	it	d1.8	
	ｼﾀﾗﾋﾞﾝ	AraC	30mg	it	d1.8	
ALL202-U　第10~11週（Sanctuary therapy）	ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ	MTX	3000mg/㎡	div	d1.8	14日
			15mg	it	d2.9	
	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ	DEX	3.3mg	div	d1.8	
	ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ	hydrocortisone	25mg	it	d2.9	
	ｼﾀﾗﾋﾞﾝ	AraC	30mg	it	d2.9	
ALL202-U　第12~13週（Reiduction therapy）	ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ	VCR	1.5mg/㎡	div	d1.8.15	28日
	ﾋﾞﾗﾙﾋﾞｼﾝ	THP	25mg/㎡	div	d1.8	
	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	500mg/㎡	div	d1.8	
	L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾅｰｾﾞ	L-ASP	6000KU/㎡	div	d1.3.5.8.10.12	
	ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ	MTX	15mg	it	d1	
	ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ	hydrocortisone	25mg	it	d1	
	ｼﾀﾗﾋﾞﾝ	AraC	30mg	it	d1	
ALL202-U　第16~19週（Reconsolidation therapy）	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	750mg/㎡	div	d1.8	28日
	ﾋﾞﾗﾙﾋﾞｼﾝ	THP	25mg/㎡	div	d1.2	
	ｼﾀﾗﾋﾞﾝ	AraC	75mg/㎡	div	d1-6.8-13	
	ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ	MTX	15mg	it	d1.8	
	ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ	hydrocortisone	25mg	it	d1.8	
	ｼﾀﾗﾋﾞﾝ	AraC	30mg	it	d1.8	

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
ALL202　Ph1陽性　15歳～60歳　寛解導入	ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ	VCR	1.3mg/㎡	div	d8.11.15.22	63日
	ﾀﾞｳﾉﾙﾋﾞｼﾝ	DNR	60mg/㎡	div	d1-3	
	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	1200mg/㎡	div	d1	
	ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ	MTX	15mg	it	d29	
	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ	DEX	3.3mg	it	d29	
	ｼﾀﾗﾋﾞﾝ	AraC	40mg	it	d29	
ALL202　Ph1陽性　60歳～65歳　寛解導入	ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ	VCR	1.3mg/㎡	div	d8.11.15.22	63日
	ﾀﾞｳﾉﾙﾋﾞｼﾝ	DNR	30mg/㎡	div	d1-3	
	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	800mg/㎡	div	d1	
	ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ	MTX	15mg	it	d29	
	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ	DEX	3.3mg	it	d29	
	ｼﾀﾗﾋﾞﾝ	AraC	40mg	it	d29	
ALL202　地固め　C1	ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ	MTX	15mg	it	d1	28日
			1000mg/㎡	div	d1	
	ｼﾀﾗﾋﾞﾝ	AraC	40mg	it	d1	
			2000mg/㎡	div	d2.3	
	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ	DEX	3.3mg	it	d1	
	ﾒﾁﾙﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ	mPSL	50mg	div	d1-3	
ALL202　地固め　C2	ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ	MTX	15mg	it	d1	28日
	ｼﾀﾗﾋﾞﾝ	AraC	40mg	it	d1	
	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ	DEX	4mg	it	d1	
ALL97　15～59歳　寛解導入	ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ	VCR	1.3mg/㎡	div	d1.8.15.22	28日
	ﾀﾞｳﾉﾙﾋﾞｼﾝ	DNR	45mg/㎡	div	d1-3.8	
	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	1200mg/㎡	div	d1	
	L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾅｰｾﾞ	L-ASP	3000KU/㎡	div	d9.11.13.16.18.20	
	ﾌﾟﾚﾄﾞﾆｿﾞﾛﾝ	PSL	60mg/㎡	po	d1-14	
ALL97　60~65歳　寛解導入	ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ	VCR	1.3mg/㎡	div	d1.8.15.22	28日
	ﾀﾞｳﾉﾙﾋﾞｼﾝ	DNR	30mg/㎡	div	d1-3	
	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	800mg/㎡	div	d1	
	L-ｱｽﾊﾟﾗｷﾞﾅｰｾﾞ	L-ASP	3000KU/㎡	div	d9.11.13.16.18.20	
ALL97　地固め・強化　第1ｺｰｽ	ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ	VCR	1.3mg/㎡	div	d1	-
	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	1000mg/㎡	div	d1	
	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	ADR	60mg/㎡	div	d1	
	ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ	MTX	15mg	it	d1	
	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ	DEX	3.3mg	it	d1	

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
ALL97　地固め・強化　第2ｺｰｽ	ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ	MTX	500mg/㎡	div	d1	-
			15mg	it	d1	
	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ	DEX	3.3mg	it	d1	
	ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ	VCR	1.3mg/㎡	div	d2	
	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	ADR	60mg/㎡	div	d2	
ALL97　地固め・強化　第3ｺｰｽ	ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ	VCR	1.3mg/㎡	div	d1	-
	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	1000mg/㎡	div	d1	
	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	ADR	60mg/㎡	div	d1	
	ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ	MTX	15mg	it	d1	
	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ	DEX	3.3mg	it	d1	
	ｼﾀﾗﾋﾞﾝ	AraC	40mg	it	d1	
ALL97　地固め・強化　第4ｺｰｽ	ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ	ETP	100mg/㎡	div	d1-4	-
	ｼﾀﾗﾋﾞﾝ	AraC	200mg/㎡	div	d1-4	
			40mg	it	d1	
	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ	DEX	3.3mg	it	d1	
	ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ	MTX	15mg	it	d1	
ALL97　地固め・強化　第5ｺｰｽ	ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ	VCR	1.3mg/㎡	div	d1	-
	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	1000mg/㎡	div	d1	
	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	ADR	60mg/㎡	div	d1	
	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ	DEX	3.3mg	it	d1	
	ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ	MTX	15mg	it	d1	
ALL97　地固め・強化　第6ｺｰｽ	ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ	MTX	500mg/㎡	div	d1	-
			15mg	it	d1	
	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ	DEX	3.3mg	it	d1	
	ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ	VCR	1.3mg/㎡	div	d2	
	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	ADR	45mg/㎡	div	d2	
ALL97　地固め・強化　第7ｺｰｽ	ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ	VCR	1.3mg/㎡	div	d1	-
	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	1000mg/㎡	div	d1	
	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	ADR	60mg/㎡	div	d1	
	ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ	MTX	15mg	it	d1	
	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ	DEX	3.3mg	it	d1	
	ｼﾀﾗﾋﾞﾝ	AraC	40mg	it	d1	
ALL97　地固め・強化　第8ｺｰｽ	ｼﾀﾗﾋﾞﾝ	AraC	200mg/㎡	div	d1-4	-
			40mg	it	d1	
	ﾒﾄﾄﾚｷｻｰﾄ	MTX	15mg	it	d1	
	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ	DEX	3.3mg	it	d1	
	ﾐﾄｷｻﾝﾄﾛﾝ	MIT	8mg/㎡	div	d2.3	
ALL97　維持　2年間	ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ	VCR	1.3mg/㎡	div	d1	-

※患者の状態に合わせて、投与量やスケジュールを変更することがあります。