<骨髄異形成症候群>

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
AraC＋ACR少量	ｼﾀﾗﾋﾞﾝ	AraC	20mg/㎡	div	d1-5	-
	ｱｸﾗﾙﾋﾞｼﾝ	ACR	10mg/㎡	div	d1-5	
AraC＋MIT 地固め1	ﾐﾄｷｻﾝﾄﾛﾝ	MIT	7mg/㎡	div	d1-3	-
	ｼﾀﾗﾋﾞﾝ	AraC	200mg/㎡	div	d1-5	
Low dose AraC	ｼﾀﾗﾋﾞﾝ	AraC	10mg/㎡	div	d1-5	-
Low dose AraC 持続	ｼﾀﾗﾋﾞﾝ	AraC	20mg/㎡	div	d1-5	-
MDS200-A 寛解導入	ｲﾀﾞﾙﾋﾞｼﾝ	IDR	12mg/㎡	div	d1-4	-
	ｼﾀﾗﾋﾞﾝ	AraC	100mg/㎡	div	d1-7	
MDS200-B 寛解導入	ｱｸﾗﾙﾋﾞｼﾝ	ACR	14mg/㎡	div	d1-4	-
	ｼﾀﾗﾋﾞﾝ	AraC	30mg/㎡	div	d1-14	
ｱｻﾞｼﾁｼﾞﾝ点滴静注	ｱｻﾞｼﾁｼﾞﾝ	AZA	75mg/㎡	div	d1-7	28日
ｱｻﾞｼﾁｼﾞﾝ点滴静注(外来)	ｱｻﾞｼﾁｼﾞﾝ	AZA	75mg/㎡	div	d1-5.8.9	28日
ｱｻﾞｼﾁｼﾞﾝ皮下投与	ｱｻﾞｼﾁｼﾞﾝ	AZA	75mg/㎡	sc	d1-7	28日
ｱｻﾞｼﾁｼﾞﾝ皮下投与(外来)	ｱｻﾞｼﾁｼﾞﾝ	AZA	75mg/㎡	sc	d1-5.8.9	28日

※患者の状態に合わせて、投与量やスケジュールを変更することがあります。