## <多発性骨髄腫>

| レジメン名 | 一般名 | 略語 | 投与量 | 投与方法 | 施行日 | 1コースの期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCEP | ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ | CDDP | 10mg/㎡ | div | d1-4 | 21日 |
| | ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ | ETP | 40mg/㎡ | div | d1-4 | |
| | ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ | CPA | 400mg/㎡ | div | d1-4 | |
| | ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ | DEX | 33mg | div | d1-4 | |
| DVd | ﾎﾞﾙﾃｿﾞﾐﾌﾞ | BOR | 1.3mg/㎡ | div | d1 | 7日 |
| | ﾀﾞﾗﾂﾑﾏﾌﾞ | Dara | 16mg/kg | div | d1 | |
| KRd(1ｻｲｸﾙ1週目 ｶｲﾌﾟﾛﾘｽ 20mg/㎡) | ｶﾙﾌｨﾙｿﾞﾐﾌﾞ | Carfilzomib | 20mg/㎡ | div | d1.2 | 7日 |
| KRd(ｶｲﾌﾟﾛﾘｽ 27mg/㎡) | ｶﾙﾌｨﾙｿﾞﾐﾌﾞ | Carfilzomib | 27mg/㎡ | div | d1.2 | 7日 |
| Kd(単独：2回目以降＝56mg/㎡) | ｶﾙﾌｨﾙｿﾞﾐﾌﾞ | Carfilzomib | 56mg/㎡ | div | d1.2 | 7日 |
| | ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ | DEX | 19.8mg | div | d1.2 | |
| Kd(単独：2回目以降＝70mg/㎡) | ｶﾙﾌｨﾙｿﾞﾐﾌﾞ | Carfilzomib | 70mg/㎡ | div | d1 | 7日 |
| | ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ | DEX | 33mg | div | d1 | |
| Kd(単独：初回＝20mg/㎡) | ｶﾙﾌｨﾙｿﾞﾐﾌﾞ | Carfilzomib | 20mg/㎡ | div | d1.2 | 7日 |
| | ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ | DEX | 19.8mg | div | d1.2 | |
| VAD | ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ | VCR | 0.4mg | div | d1-4 | 20日 |
| | ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ | ADR | 9mg/㎡ | div | d1-4 | |
| | ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ | DEX | 33mg | div | d1-4 | |
| VELCADE | ﾎﾞﾙﾃｿﾞﾐﾌﾞ | BOR | 1.3mg/㎡ | sc | d1 | - |
| | ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ | DEX | 16.5mg | div | d1.2.4.5.8.9.11.12 | |
| VELCADE（1回分） | ﾎﾞﾙﾃｿﾞﾐﾌﾞ | BOR | 1.3mg/㎡ | sc | d1 | - |
| | ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ | DEX | 16.5mg | div | d1.2 | |
| VELCADE 皮下注（1回分） | ﾎﾞﾙﾃｿﾞﾐﾌﾞ | BOR | 1.3mg/㎡ | sc | d1 | - |
| | ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ | DEX | 16.5mg | div | d1.2 | |
| VELCADE 減量 | ﾎﾞﾙﾃｿﾞﾐﾌﾞ | BOR | 1.3mg/㎡ | sc | d1 | - |
| | ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ | DEX | 16.5mg | div | d1 | |
| ｲｻﾂｷｼﾏﾌﾞ | ｲｻﾂｷｼﾏﾌﾞ | Isa | 20mg/kg | div | d1 | - |
| ｲｻﾂｷｼﾏﾌﾞ （ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ併用） | ｲｻﾂｷｼﾏﾌﾞ | Isa | 20mg/kg | div | d1 | - |
| | ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ | DEX | 39.6mg | div | d1 | |
| ｲｻﾂｷｼﾏﾌﾞ （ﾎﾟﾏﾘﾄﾞﾐﾄﾞ併用） | ｲｻﾂｷｼﾏﾌﾞ | Isa | 10mg/kg | div | 1kur:d1.8.15.22、2kur以降~:d1.15 | 28日 |
| | ﾎﾟﾏﾘﾄﾞﾐﾄﾞ | POM | 4mg | po | d 1-21 | |
| | ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ | DEX | 33mg | div | d1.8.15.22 | |
| ｴﾛﾂｽﾞﾏﾌﾞ | ｴﾛﾂｽﾞﾏﾌﾞ | Elo | 10mg/kg | div | d1 | - |
| | ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ | DEX | 6.6mg | div | d1 | |
| ｴﾛﾂｽﾞﾏﾌﾞ （ﾎﾟﾏﾘﾄﾞﾐﾄﾞ併用　3ｸｰﾙ目以降） | ｴﾛﾂｽﾞﾏﾌﾞ | Elo | 20mg/kg | div | d1 | 28日 |
| | ﾎﾟﾏﾘﾄﾞﾐﾄﾞ | POM | 4mg | po | d 1-21 | |
| | ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ | DEX | 6.6mg | div | d1.8.15.22 | |

| レジメン名 | 一般名 | 略語 | 投与量 | 投与方法 | 施行日 | 1コースの期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾀﾞﾗﾂﾑﾏﾌﾞ（2回目以降） | ﾀﾞﾗﾂﾑﾏﾌﾞ | Dara | 16㎎/kg | div | d1 | 7日 |
| | ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ | DEX | 19.8mg | div | d1.2 | |
| ﾀﾞﾗﾂﾑﾏﾌﾞ（初回） | ﾀﾞﾗﾂﾑﾏﾌﾞ | Dara | 16㎎/kg | div | d1 | 8日 |
| | ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ | DEX | 19.8mg | div | d1.2 | |
| ﾀﾞﾗﾂﾑﾏﾌﾞ（皮下注） | ﾀﾞﾗﾂﾑﾏﾌﾞ | Dara | 1800mg | sc | d1 | 9日 |
| | ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ | DEX | 16.5mg | div | d1 | |
| 【初回】ｴﾙﾗﾅﾀﾏﾌﾞ | ｴﾙﾗﾅﾀﾏﾌﾞ | Elranatamab | 12mg | sc | d1 | 14日 |
| | | | 32mg | sc | d4 | |
| | | | 76mg | sc | d8 | |
| 【3週～24週】ｴﾙﾗﾅﾀﾏﾌﾞ | ｴﾙﾗﾅﾀﾏﾌﾞ | Elranatamab | 76mg | sc | d1 | 7日 |
| 【25週以降】ｴﾙﾗﾅﾀﾏﾌﾞ | ｴﾙﾗﾅﾀﾏﾌﾞ | Elranatamab | 76mg | sc | d1 | 14日 |
| 【1～4ｻｲｸﾙ】Isa+VRd療法 | ｲｻﾂｷｼﾏﾌﾞ | Isa | 10mg/kg | div | d1.8.15.22.29(d8.22:1kur目のみ) | 42日 |
| | ﾎﾞﾙﾃｿﾞﾐﾌﾞ | BOR | 1.3mg/㎡ | Sc | d1.4.8.11.22.25.29.32 | |
| | ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞ | LEN | 25mg | po | d1-14、d22-35 | |
| | ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ | DEX | 19.8mg | div | d1.2.4.5.8.9.11.12.15.22.23.25.26.29.30.32.33 | |
| 【5～17ｻｲｸﾙ】Isa+VRd療法 | ｲｻﾂｷｼﾏﾌﾞ | Isa | 10mg/kg | div | d1.15 | 28日 |
| | ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞ | LEN | 25mg | po | d1-21 | |
| | ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ | DEX | 19.8mg | div | d1.8.15.22 | |
| 【18ｻｲｸﾙ目以降】Isa+VRd療法 | ｲｻﾂｷｼﾏﾌﾞ | Isa | 10mg/kg | div | d1 | 28日 |
| | ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞ | LEN | 25mg | po | d1-21 | |
| | ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ | DEX | 19.8mg | div | d1.8.15.22 | |
| 【移植適応:1～2ｺｰｽ目】DARA+VRd療法 | ﾀﾞﾗﾂﾑﾏﾌﾞ | Dara | 1800mg | Sc | d1.8.15.22 | 28日 |
| | ﾎﾞﾙﾃｿﾞﾐﾌﾞ | BOR | 1.3mg/㎡ | Sc | d1.4.8.11 | |
| | ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞ | LEN | 25mg | po | d1-21 | |
| | ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ | DEX | 40mg | po | d1-4.8.9-12.15.22 | |
| 【移植適応:3～6ｺｰｽ目】DARA+VRd療法 | ﾀﾞﾗﾂﾑﾏﾌﾞ | Dara | 1800mg | Sc | d1.15 | 28日 |
| | ﾎﾞﾙﾃｿﾞﾐﾌﾞ | BOR | 1.3mg/㎡ | Sc | d1.4.8.11 | |
| | ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞ | LEN | 25mg | po | d1-21 | |
| | ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ | DEX | 40mg | po | d1-4.9-12.15 | |
| 【移植適応:7ｺｰｽ目以降】DARA+VRd療法 | ﾀﾞﾗﾂﾑﾏﾌﾞ | Dara | 1800mg | Sc | d1 | 28日 |
| | ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞ | LEN | 10mg | po | d1-28 | |
| | ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ | DEX | 40mg | po | d1 | |
| 【移植非適応:1～2ｺｰｽ目】DARA+VRd療法 | ﾀﾞﾗﾂﾑﾏﾌﾞ | Dara | 1800mg | Sc | d1.8.15 | 21日 |
| | ﾎﾞﾙﾃｿﾞﾐﾌﾞ | BOR | 1.3mg/㎡ | Sc | d1.4.8.11 | |
| | ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞ | LEN | 25mg | po | d1-14 | |
| | ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ | DEX | 20mg又は40mg | po | d1.2.4.5.8.9.11.12.15 | |

| レジメン名 | 一般名 | 略語 | 投与量 | 投与方法 | 施行日 | 1コースの期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【移植非適応:3～8ｺｰｽ目】DARA+VRd療法 | ﾀﾞﾗﾂﾑﾏﾌﾞ | Dara | 1800mg | Sc | d1 | 21日 |
| | ﾎﾞﾙﾃｿﾞﾐﾌﾞ | BOR | 1.3mg/㎡ | Sc | d1.4.8.11 | |
| | ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞ | LEN | 25mg | po | d1-14 | |
| | ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ | DEX | 20mg又は40mg | po | d1.2.4.5.8.9.11.12 | |
| 【移植非適応:9ｺｰｽ目以降】DARA+VRd療法 | ﾀﾞﾗﾂﾑﾏﾌﾞ | Dara | 1800mg | Sc | d1 | 28日 |
| | ﾚﾅﾘﾄﾞﾐﾄﾞ | LEN | 25mg | po | d1-21 | |
| | ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ | DEX | 20mg又は40mg | po | d1.8.15.22 | |
| 【初回】ﾄｱﾙｸｴﾀﾏﾌﾞ療法 | ﾄｱﾙｸｴﾀﾏﾌﾞ | Talquetamab | 0.01mg/kg | Sc | d1 | 21日 |
| | | | 0.06mg/kg | Sc | d3 | |
| | | | 0.4mg/kg | Sc | d5 | |
| | | | 0.8mg/kg | Sc | d7 | |
| 【維持】ﾄｱﾙｸｴﾀﾏﾌﾞ療法 | ﾄｱﾙｸｴﾀﾏﾌﾞ | Talquetamab | 0.8mg/kg | Sc | d1 | 14日 |

※患者の状態に合わせて、投与量やスケジュールを変更することがあります。