**<慢性リンパ性白血病>**

| レジメン名 | 一般名 | 略語 | 投与量 | 投与方法 | 施行日 | 1コースの期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【導入】Alemtuzumab | ｱﾚﾑﾂｽﾞ ﾏﾌﾞ | Alemtuzumab | 3mg | div | d1 | - |
| | | | 10mg | div | d2 | |
| | | | 30mg | div | d3 | |
| 【維持】Alemtuzumab | ｱﾚﾑﾂｽﾞ ﾏﾌﾞ | Alemtuzumab | 30mg | div | d1.3.5 | 7日（導入を含め最大12週まで） |
| FUL増量 | ﾌﾙﾀﾞﾗﾋﾞﾝ | FLU | 25mg/㎡ | div | d1-5 | - |
| FUL | ﾌﾙﾀﾞﾗﾋﾞﾝ | FLU | 20mg/㎡ | div | d1-5 | - |
| 【初回】ﾘﾂｷｻﾝ療法 | ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ | RIT | 375mg/㎡ | div | d1 | - |
| 【2回目以降】ﾘﾂｷｻﾝ療法 | ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ | RIT | 500mg/㎡ | div | d1 | - |
| ｵﾝｺﾋﾞﾝ単独 | ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ | VCR | 1mg/㎡ | div | d1.8.15.22 | - |

※患者の状態に合わせて、投与量やスケジュールを変更することがあります。