<卵巣がん>

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
DC(3週毎)＋BEV	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	DTX	75mg/㎡	div	d1	21日
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC6	div	d1	
	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	BEV	15mg/kg	div	d1	
mTC(3週毎)	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	PTX	180mg/㎡	div	d1	21日
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC6	div	d1	
DC(3週毎)	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	DTX	75mg/㎡	div	d1	21日
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC6	div	d1	
GEM＋CBDCA	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	GEM	1000mg/㎡	div	d1.8	21日
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC4	div	d1	
PLD＋CBDCA	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	PLD	30mg/㎡	div	d1	28日
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC5	div	d1	
wTC＋BEV	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	PTX	80mg/㎡	div	d1.8.15	21日
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC5	div	d1	
	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	BEV	15mg/kg	div	d1	
mTC＋BEV	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	PTX	175mg/㎡	div	d1	21日
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC6	div	d1	
	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	BEV	15mg/kg	div	d1	
ddTC(3週毎)	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	PTX	80mg/㎡	div	d1.8.15	21日
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC6	div	d1	
GEM＋CBDCA＋BEV	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	GEM	1000mg/㎡	div	d1.8	21日
	ｶﾙﾎﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	CBDCA	AUC4	div	d1	
	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	BEV	15mg /kg	div	d1	
PLD＋BEV	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	PLD	40mg/㎡	div	d1	28日
	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	BEV	15mg /kg	div	d1	
CPT-11＋BEV	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	CPT-11	150mg/㎡	div	d1	21日
	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	BEV	15mg /kg	div	d1	
PLD＋BEV	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	PLD	40mg/㎡	div	d1	28日
	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	BEV	10mg /kg	div	d1.15	
PTX＋NDP	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	PTX	180mg/㎡	div	d1	21日
	ﾈﾀﾞﾌﾟﾗﾁﾝ	NDP	80mg/㎡	div	d1	

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
weekly PTX	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	PTX	80mg/㎡	div	d1.8.15	28日
DTX	ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ	DTX	70mg/㎡	div	d1	21日
PLD	ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ	PLD	50mg/㎡	div	d1	28日
CPT-11	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	CPT-11	150mg/㎡	div	d1.15	35日
GEM	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	GEM	1000mg/㎡	div	d1.8.15	28日
NGT	ﾉｷﾞﾃｶﾝ	NGT	1.5mg/㎡	div	d1-5	21日
BEV	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	BEV	15mg/kg	div	d1	21日

※患者の状態に合わせて、投与量やスケジュールを変更することがあります。