<絨毛性疾患>

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
MTX(静注)	ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ	MTX	20mg/body	div	d1-5	7日
MTX(筋注)	ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ	MTX	20mg/body	im	d1-5	7日
MA	ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ	MTX	20mg/body	div	d1-5	14日
	ｱｸﾁﾉﾏｲｼﾝD	ACT-D	0.2mg /body	div	d1-5	
MEA	ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ	MTX	150mg/body	iv	d1	21日
	ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ	MTX	300mg/body	div	d1	
	ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ	ETP	100mg/㎡	div	d1-5	
	ｱｸﾁﾉﾏｲｼﾝD	ACT-D	0.5mg /body	div	d1-5	
MTX単回(筋注)	ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ	MTX	50mg/㎡	im	d1	7日
EMA/CO	ｱｸﾁﾉﾏｲｼﾝD	ACT-D	0.5mg/body	div	d1-2	14日
	ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ	ETP	100mg/㎡	div	d1-2	
	ﾒｿﾄﾚｷｾｰﾄ	MTX	300mg/㎡	div	d1	
	ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ	VCR	1mg/㎡	div	d8	
	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ	CPA	600mg /㎡	div	d8	

※患者の状態に合わせて、投与量やスケジュールを変更することがあります。