大腸がん

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
ｱﾊﾞｽﾁﾝ+TS- 1	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	BEV	5mg/kg	div	d1.15.29	42日
	ﾃｶﾞﾌｰﾙ/ｷﾞﾒﾗｼﾙ/ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ	S-1	80mg/㎡/day	po	d1-28	
ﾄﾎﾟﾃｼﾝ(A法)	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	CPT-11	100mg/㎡	div	d1.8.15	28日
ﾄﾎﾟﾃｼﾝ(B法)　2回投与	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	CPT-11	150mg/㎡	div	d1.15	35日
ﾄﾎﾟﾃｼﾝ(B法) 3回投与	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	CPT-11	150mg/㎡	div	d1.15.29	49日
IRIS	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	CPT-11	100mg/㎡	div	d1.15	28日
	ﾃｶﾞﾌｰﾙ/ｷﾞﾒﾗｼﾙ/ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ	S-1	80mg/㎡/day	po	d1-14	
ﾄﾎﾟﾃｼﾝ(2週毎)	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	CPT-11	100mg/㎡	div	d1	14日
ﾄﾎﾟﾃｼﾝ+ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	CPT-11	150mg/㎡	div	d1	14日
	ﾊﾟﾆﾂﾑﾏﾌﾞ	P-mab	6mg/kg			
mXELIRI+ｱﾊﾞｽﾁﾝ	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	BEV	7.5mg/kg	div	d1	21日
	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	CPT-11	200mg/㎡			
	ｶﾍﾞｼﾀﾋﾞﾝ	Cape	1600mg/㎡/day	po	d1-14	
ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ(初回)+ﾋﾞﾗﾌﾄﾋﾞ・ﾒｸﾄﾋﾞ	ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ	C-mab	400mg/㎡	div	d1	7日
	ｴﾝｺﾗﾌｪﾆﾌﾞ	Encorafenib	300mg/body/day	po	d1-7	
	ﾋﾞﾆﾒﾁﾆﾌﾞ	Binimetinib	90mg/body/day			
ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ(2回目以降)+ﾋﾞﾗﾌﾄﾋﾞ・ﾒｸﾄﾋﾞ	ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ	C-mab	250mg/㎡	div	d1	7日
	ｴﾝｺﾗﾌｪﾆﾌﾞ	Encorafenib	300mg/body/day	po	d1-7	
	ﾋﾞﾆﾒﾁﾆﾌﾞ	Binimetinib	90mg/body/day			
ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ単独(初回)	ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ	C-mab	400mg/㎡	div	d1	7日
ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ単独(2回目以降)	ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ	C-mab	250mg/㎡	div	d1	7日
ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ+ﾄﾎﾟﾃｼﾝ(毎週/初回)	ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ	C-mab	初回 400mg/㎡、2回目以降 250mg/㎡	div	d1.8.15.22.29.36	42日
	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	CPT-11	100mg/㎡		d1.8.15.22	
ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ+ﾄﾎﾟﾃｼﾝ(毎週/2回目以降)	ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ	C-mab	250mg/㎡	div	d1.8.15.22.29.36	42日
	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	CPT-11	100mg/㎡		d1.8.15.22	
ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ+ﾄﾎﾟﾃｼﾝ(2週毎/初回)	ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ	C-mab	初回 400mg/㎡、2回目以降 250mg/㎡	div	d1.8.15.22.29.36.43	49日
	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	CPT-11	150mg/㎡		d1.15.29	
ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ+ﾄﾎﾟﾃｼﾝ(2週毎/2回目以降)	ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ	C-mab	250mg/㎡	div	d1.8.15.22.29.36.43	49日
	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	CPT-11	150mg/㎡	div	d1.8.15.29	
ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ+FOLFIRI(初回)	ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ	C-mab	初回 400mg/㎡、2回目以降 250mg/㎡	div	d1.8	14日
	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	l -LV	200mg/㎡	div	d1	
	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	CPT-11	150mg/㎡	div	d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	400mg/㎡	bolus	d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	2400mg/㎡	Ci	d1-2	
ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ+FOLFIRI(2回目以降)	ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ	C-mab	250mg/㎡	div	d1.8	14日
	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	l -LV	200mg/㎡	div	d1	
	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	CPT-11	150mg/㎡	div	d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	400mg/㎡	bolus	d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	2400mg/㎡	Ci	d1-2	

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ+mFOLFOX6(初回)	ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ	C-mab	初回 400mg/㎡、2回目以降 250mg/㎡	div	d1.8	14日
	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	l -LV	200mg/㎡	div	d1	
	ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ	L-OHP	85mg/㎡	div	d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	400mg/㎡	bolus	d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	2400mg/㎡	Ci	d1-2	
ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ+mFOLFOX6(2回目以降)	ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ	C-mab	200mg/㎡	div	d1.8	14日
	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	l -LV	200mg/㎡	div	d1	
	ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ	L-OHP	85mg/㎡	div	d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	400mg/㎡	bolus	d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	2400mg/㎡	Ci	d1-2	
ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ+FOLFOX4(初回)	ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ	C-mab	初回 400mg/㎡、2回目以降 250mg/㎡	div	d1.8	14日
	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	l -LV	100mg/㎡		d1-2	
	ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ	L-OHP	85mg/㎡		d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	400mg/㎡		d1-2	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	600mg/㎡		d1-2	
ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ+FOLFOX4(2回目以降)	ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ	C-mab	250mg/㎡	div	d1.8	14日
	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	l -LV	100mg/㎡		d1-2	
	ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ	L-OHP	85mg/㎡		d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	400mg/㎡		d1-2	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	600mg/㎡		d1-2	
Bi-weekly ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ+mFOLFOX6	ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ	C-mab	500mg/㎡	div	d1	14日
	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	l -LV	200mg/㎡	div	d1	
	ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ	L-OHP	85mg/㎡	div	d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	400mg/㎡	bolus	d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	2400mg/㎡	Ci	d1-2	
Bi-weekly ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ+ﾄﾎﾟﾃｼﾝ　2週毎	ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ	C-mab	500mg/㎡	div	d1	14日
	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	CPT-11	150mg/㎡			
Bi-weekly ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ単独　2週毎	ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ	C-mab	500mg/㎡	div	d1	14日
ﾍﾟｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ単独	ﾊﾟﾆﾂﾑﾏﾌﾞ	P-mab	6mg/kg	div	d1	14日
ﾄﾎﾟﾃｼﾝ+ﾍﾟｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ	ﾊﾟﾆﾂﾑﾏﾌﾞ	P-mab	6mg/kg	div	d1	14日
	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	CPT-11	150mg/㎡			
ﾍﾟｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ+FOLFIRI	ﾊﾟﾆﾂﾑﾏﾌﾞ	P-mab	6mg/kg	div	d1	14日
	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	l -LV	200mg/㎡	div	d1	
	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	CPT-11	150mg/㎡	div	d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	400mg/㎡	bolus	d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	2400mg/㎡	Ci	d1-2	
ﾍﾟｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ+mFOLFOX6	ﾊﾟﾆﾂﾑﾏﾌﾞ	P-mab	6mg/kg	div	d1	14日
	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	l -LV	200mg/㎡	div	d1	
	ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ	L-OHP	85mg/㎡	div	d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	400mg/㎡	bolus	d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	2400mg/㎡	Ci	d1-2	

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ+FOLFOX4	ﾊﾟﾆﾂﾑﾏﾌﾞ	P-mab	6mg/kg	div	d1	14日
	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	l -LV	100mg/㎡		d1-2	
	ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ	L-OHP	85mg/㎡		d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	400mg/㎡		d1-2	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	600mg/㎡		d1-2	
FOLFIRI	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	l -LV	200mg/㎡	div	d1	14日
	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	CPT-11	150mg/㎡	div	d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	400mg/㎡	bolus	d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	2400mg/㎡	Ci	d1-2	
5-FU+ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	l -LV	250mg/㎡	div	d1.8.15.22.29.36	56日
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	600mg/㎡			
sLV5FU2	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	l -LV	200mg/㎡	div	d1	14日
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	400mg/㎡	bolus	d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	2400mg/㎡	Ci	d1-2	
mFOLFOX6	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	l -LV	200mg/㎡	div	d1	14日
	ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ	L-OHP	85mg/㎡	div	d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	400mg/㎡	bolus	d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	2400mg/㎡	Ci	d1-2	
XELOX	ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ	L-OHP	130mg/㎡	div	d1	21日
	ｶﾍﾞｼﾀﾋﾞﾝ	Cape	2000mg/㎡/day	po	d1-14	
XELOX+ｱﾊﾞｽﾁﾝ	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	BEV	7.5mg/kg	div	d1	21日
	ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ	L-OHP	130mg/㎡	div	d1	
	ｶﾍﾞｼﾀﾋﾞﾝ	Cape	2000mg/㎡/day	po	d1-14	
FOLFIRI+ｱﾊﾞｽﾁﾝ(5mg/kg)	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	BEV	5mg/kg	div	d1	14日
	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	l -LV	200mg/㎡	div	d1	
	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	CPT-11	150mg/㎡	div	d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	400mg/㎡	bolus	d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	2400mg/㎡	Ci	d1-2	
mFOLFOX6+ｱﾊﾞｽﾁﾝ(5mg/kg)(一次・二次治療)	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	BEV	5mg/kg	div	d1	14日
	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	l -LV	200mg/㎡	div	d1	
	ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ	L-OHP	85mg/㎡	div	d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	400mg/㎡	bolus	d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	2400mg/㎡	Ci	d1-2	
FOLFOX4	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	l -LV	100mg/㎡	div	d1-2	14日
	ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ	L-OHP	85mg/㎡		d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	400mg/㎡		d1-2	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	600mg/㎡		d1-2	
FOLFOX4+ｱﾊﾞｽﾁﾝ(5mg/kg)(一次・二次治療)	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	BEV	5mg/kg	div	d1	14日
	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	l -LV	100mg/㎡		d1-2	
	ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ	L-OHP	85mg/㎡		d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	400mg/㎡		d1-2	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	600mg/㎡		d1-2	

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
FOLFOX4+ｱﾊﾞｽﾁﾝ(10mg/kg)(一次・二次治療)	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	BEV	10mg/kg	div	d1	14日
	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	l -LV	100mg/㎡		d1-2	
	ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ	L-OHP	85mg/㎡		d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	400mg/㎡		d1-2	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	600mg/㎡		d1-2	
5-FU+ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄﾄ+ｱﾊﾞｽﾁﾝ(5mg/kg)	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	BEV	5mg/kg	div	d1.15.29.43	56日
	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	l -LV	250mg/㎡		d1.8.15.22.29.36	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	600mg/㎡			
sLV5FU2+ｱﾊﾞｽﾁﾝ(5mg/kg)	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	BEV	5mg/kg	div	d1	14日
	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	l -LV	200mg/㎡	div	d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	400mg/㎡	bolus	d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	2400mg/㎡	Ci	d1-2	
mFOLFOX6+ｱﾊﾞｽﾁﾝ(10mg/kg)(増悪時二次治療)	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	BEV	10mg/kg	div	d1	14日
	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	l -LV	200mg/㎡	div	d1	
	ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ	L-OHP	85mg/㎡	div	d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	400mg/㎡	bolus	d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	2400mg/㎡	Ci	d1-2	
ｱﾊﾞｽﾁﾝ+ｾﾞﾛｰﾀﾞ	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	BEV	7.5mg/kg	div	d1	21日
	ｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝ	Cape	2000mg/㎡/day	po	d1-14	
FOLFIRI+ｻｲﾗﾑｻﾞ(2次治療以降)	ﾗﾑｼﾙﾏﾌﾞ	R-mab	8mg/kg	div	d1	14日
	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	l -LV	200mg/㎡	div	d1	
	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	CPT-11	150mg/㎡	div	d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	400mg/㎡	bolus	d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	2400mg/㎡	Ci	d1-2	
FOLFOXIRI	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	l -LV	200mg/㎡	div	d1	14日
	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	CPT-11	150mg/㎡	div	d1	
	ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ	L-OHP	85mg/㎡	bolus	d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	2400mg/㎡	Ci	d1-2	
FOLFOXIRI+ｱﾊﾞｽﾁﾝ(12クールまで)	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	BEV	5mg/kg	div	d1	14日
	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	l -LV	200mg/㎡	div	d1	
	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	CPT-11	150mg/㎡	div	d1	
	ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ	L-OHP	85mg/㎡	bolus	d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	2400mg/㎡	Ci	d1-2	
FOLFIRI+ｻﾞﾙﾄﾗｯﾌﾟ(4mg/kg)	ｱﾌﾘﾍﾞﾙｾﾌﾟﾄﾍﾞｰﾀ	AFL	4mg/kg	div	d1	14日
	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	l -LV	200mg/㎡	div	d1	
	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	CPT-11	150mg/㎡	div	d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	400mg/㎡	bolus	d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	2400mg/㎡	Ci	d1-2	
ﾛﾝｻｰﾌ+ｱﾊﾞｽﾁﾝ	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	BEV	5mg/kg	div	d1.15	28日
	FTD/TPI	FTD/TPI	70mg/㎡/day	po	d1-5.8-12	
mXELIRI	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	CPT-11	200mg/㎡	div	d1	21日
	ｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝ	Cape	1600mg/㎡/day	po	d1-14	

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
mXELIRI+ｱﾊﾞｽﾁﾝ(7.5mg/kg)	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	BEV	7.5mg/kg	div	d1	21日
	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	CPT-11	200mg/㎡			
	ｶﾍﾟｼﾀﾋﾞﾝ	Cape	1600mg/㎡/day	po	d1-14	
IRIS+ｱﾊﾞｽﾁﾝ	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	BEV	5mg/kg	div	d1.15	28日
	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	CPT-11	100mg/㎡			
	ﾃｶﾞﾌｰﾙ/ｷﾞﾒﾗｼﾙ/ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ	S-1	80mg/㎡/day	po	d1-14	
SOX	ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ	L-OHP	130mg/㎡	div	d1	21日
	ﾃｶﾞﾌｰﾙ/ｷﾞﾒﾗｼﾙ/ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ	S-1	80mg/㎡/day	po	d1-14	
SOX+ｱﾊﾞｽﾁﾝ(7.5mg/kg)	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	BEV	7.5mg/kg	div	d1	21日
	ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ	L-OHP	130mg/㎡			
	ﾃｶﾞﾌｰﾙ/ｷﾞﾒﾗｼﾙ/ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ	S-1	80mg/㎡/day	po	d1-14	
IRIS+ｱﾊﾞｽﾁﾝ(10mg/kg)(2次治療以降)	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	BEV	10mg/kg	div	d1.15	28日
	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	CPT-11	100mg/㎡			
	ﾃｶﾞﾌｰﾙ/ｷﾞﾒﾗｼﾙ/ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ	S-1	80mg/㎡/day	po	d1-14	
SOX+ｱﾊﾞｽﾁﾝ(10mg/kg)(2次治療以降)	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ	BEV	10mg/kg	div	d1	21日
	ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ	L-OHP	130mg/㎡			
	ﾃｶﾞﾌｰﾙ/ｷﾞﾒﾗｼﾙ/ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ	S-1	80mg/㎡/day	po	d1-14	
【初回】ﾊﾟｰｼﾞｪﾀ+ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ(2次治療以降)	ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ	PER	840mg/body	div	d1	21日
	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	HER	8mg/kg			
【2回目以降】ﾊﾟｰｼﾞｪﾀ+ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ(2次治療以降)	ﾍﾟﾙﾂｽﾞﾏﾌﾞ	PER	420mg/body	div	d1	21日
	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞ	HER	6mg/kg			
ﾍﾟｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ+ﾙﾏｹﾗｽ	ﾊﾟﾆﾂﾑﾏﾌﾞ	P-mab	6mg/kg	div	d1	14日
	ｿﾄﾗｼﾌﾞ	sotrsib	960mg/回	po	連日	
EC+mFOLFOX6	ｴﾝｺﾗﾌｪﾆﾌﾞ	Encorafenib	300mg/body/day	po	連日	14日
	ｾﾂｷｼﾏﾌﾞ	C-mab	500mg/㎡	div	d1	
	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	l -LV	200mg/㎡	div	d1	
	ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ	L-OHP	85mg/㎡	div	d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	400mg/㎡	bolus	d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	2400mg/㎡	Ci	d1-2	
ｵﾌﾞｼﾞｰﾎﾞ+ﾔｰﾎﾞｲ【最大4回】	ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ	Nivo	240mg/body	div	d1	21日
	ｲﾋﾞﾘﾑﾏﾌﾞ	IPI	3mg/kg			
ｵﾌﾞｼﾞｰﾎﾞ(240mg)	ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ	Nivo	240mg/body	div	d1	14日
ｵﾌﾞｼﾞｰﾎﾞ(480mg)	ﾆﾎﾞﾙﾏﾌﾞ	Nivo	480mg/body	div	d1	28日

※患者の状態に合わせて、投与量やスケジュールを変更することがあります。