胆道癌

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
GEM	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	GEM	1000mg/㎡	div	d1.8.15	28日
GC	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	CDDP	25mg/㎡	div	d1	21日
	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	GEM	1000mg/㎡			
GS	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	GEM	1000mg/㎡	div	d1.8	21日
【最大8ｺｰｽ】Durvalumab+GC	ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ	Durvalumab	1500mg	div	d1	21日
	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	CDDP	25mg/㎡		d1.8	
	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	GEM	1000mg/㎡			
【維持】Durvalumab	ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ	Durvalumab	1500mg	div	d1	28日
GCS	ﾃｶﾞﾌｰﾙ/ｷﾞﾒﾗｼﾙ/ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ	S-1	80mg/㎡/day	po	d1-7	21日
	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	CDDP	25mg/㎡	div	d1	
	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	GEM	1000mg/㎡			
Pembrolizumab+GC	ﾍﾟﾝﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ	Pembro	200mg	div	d1	21日
	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	CDDP	25mg/㎡		d1.8	
	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	GEM	1000mg/㎡			
【維持】Pembrolizumab+GC	ﾍﾟﾝﾌﾞﾛﾘｽﾞﾏﾌﾞ	Pembro	200mg	div	d1	21日
	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	GEM	1000mg/㎡		d1.8	

※患者の状態に合わせて、投与量やスケジュールを変更することがあります。