膵癌

レジメン名	一般名	略語	投与量	投与方法	施行日	1コースの期間
GS(3週1ｸｰﾙ)	ﾃｶﾞﾌｰﾙ/ｷﾞﾒﾗｼﾙ/ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ	S-1	80mg/㎡/日	po	d1-14	21日
	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	GEM	1000mg/㎡	div	d1.8	
ｼﾞｪﾑｻﾞｰﾙ(2投1休)	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	GEM	1000mg/㎡	div	d1.8	21日
ｼﾞｪﾑｻﾞｰﾙ+ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ(4週1ｸｰﾙ)	ｱﾙﾌﾞﾐﾝ懸濁型ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ	nab-PTX	125mg/㎡	div	d1.8.15	28日
	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	GEM	1000mg/㎡			
mFOLFIRINOX	ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ	L-OHP	85mg/㎡	div	d1	14日
	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	l -LV	200mg/㎡	div	d1	
	ｲﾘﾉﾃｶﾝ	CPT-11	150mg/㎡	div	d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	2400mg/㎡	Ci	d1-2	
ｼﾞｪﾑｻﾞｰﾙ+ﾀﾙｾﾊﾞ	ｴﾙﾛﾁﾆﾌﾞ	Erlotinib	100mg/body/day	po	d1-28	28日
	ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝ	GEM	1000mg/㎡	div	d1.8.15	
ｵﾆﾊﾞｲﾄﾞ+5FU+LV	ﾅﾉﾘﾎﾟｿｰﾑ型ｲﾘﾉﾃｶﾝ	nal-IRI	70mg/㎡	div	d1	14日
	ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ	l-LV	200mg/㎡	div	d1	
	ﾌﾙｵﾛｳﾗｼﾙ	5-FU	2400mg/㎡	Ci	d1-2	

※患者の状態に合わせて、投与量やスケジュールを変更することがあります。